

Gestion du linge
Risque infectieux – Réponses Kahoot

Formation des Nouveaux CHH - Mai 2025

Session 4

CPIAS Iles de Guadeloupe



Rôle du linge dans la transmission des IAS ?

Risque pour le personnel

- *Le linge peut être contaminant dans son circuit d'évacuation (linge sale)*
- *mais aussi dans son circuit propre lorsqu'il se trouve accidentellement contaminé*

Risque pour les résidents

Rôle du linge dans la transmission des IAS ?

La **contamination du linge propre** peut-être liée à:

1. Une insuffisance de lavage
2. Une mauvaise utilisation des produits lessiviels
3. Un non respect de la température et de la durée de lavage du linge
4. Un repassage et un séchage insuffisant

Lavage inefficace





Rôle du linge dans la transmission des IAS?

La **contamination du linge** propre peut-être liée à une rupture de la chaîne au cours du circuit propre:

- des mains souillées qui contaminent du linge propre
- le linge propre tombé à terre et remis dans le circuit propre
- des armoires à linge non nettoyées
- des zones de stockage non nettoyées

= risque infectieux pour les patients en contact avec ce linge contaminé

Rôle du linge dans la transmission des IAS ?

Non respect des circuits propres et sales



= risque infectieux pour le linge des patients le personnel des unités de soins et le personnel de la blanchisserie

Quels micro-organismes peut-on retrouver dans le linge sale ?



Les bactéries
elles se reproduisent ++++++
dans l 'humidité, la chaleur,






Les virus:
Virus du SIDA (VIH), virus de l'hépatite B (VHB), virus de l'hépatite C (VHC)
Virus des gastro-entérites….

Prévention efficace:
➔ Hygiène des mains
➔ Tenue de protection
➔ Vaccination
➔ Organisation d'un circuit

Les champignons
Levure, moisissures…




Les parasites
Gale - Poux

Rôle du linge dans la transmission des IAS ?

Délai de contamination du linge après 1er contact avec une personne

- Dès l'occupation du lit le linge est rapidement contaminé
- Une prolifération bactérienne s'observe après 8 heures (voire même 3 h) d'occupation du lit:
  - effet de la chaleur et de l'humidité
- On observe:
  - 10 bactéries/cm2 : linge prélevé au lit du patient*
  - 10.000 à 1 000 000 bactéries/cm2 : linge sale en blanchisserie après transport dans un sac

Norme RABC

Le système d'analyse des risques et de maîtrise de la biocontamination (Risk Analysis Biocontamination Control system)

- Critères :
  - linge propre : contamination inférieure à 12 UFC / 25 cm2 en fin de traitement à la blanchisserie
  - linge de qualité microbiologique maîtrisée : aucun germe hospitalier à l'origine des infections nosocomiales dans cette marge de 12 UFC / 25 cm2.

Tri et Conditionnement du linge sale

RECOMMANDATIONS

•Supprimer tout contact du linge sale avec la peau désinfectée et/ou lésée

•Le port des gants est obligatoire lors de présence de sang et de liquide biologique

•Limiter au maximum l' aérobiocontamination en manipulant le linge

- Ne pas secouer, ne pas compter le linge sale
- Garder fermé les sacs de linge sale

•Retirer du linge tous les objets

•Ne pas mettre en contact le linge sale et sa tenue

•Protéger sa tenue avec un tablier plastique à u.u lors de contact avec du linge sale

•Désinfecter les mains après tout contact

Les EPI lors de la manipulation de linge sale

- Protéger sa tenue avec un tablier plastique à u.u lors de contact avec du linge sale
- Ne pas mettre en contact le linge sale et sa tenue

- Le port des gants est obligatoire lors de présence de sang et de liquide biologique
- Désinfecter les mains après tout contact avec le linge sale

INOCULUM

P2: EPI. Protection de la tenue

■ **R15. Porter un tablier imperméable à usage unique lors de tout soin souillant ou mouillant ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produit biologique d'origine humaine.**

■ **R16. Porter une surblouse imperméable à manches longues à usage unique en cas d'exposition majeure aux produits biologiques d'origine humaine.**

Commentaire : la surblouse imperméable peut être remplacée par une surblouse à manches longues ET un tablier imperméable, les deux à usage unique.

■ **R17. Mettre la protection juste avant le geste, l'éliminer immédiatement à la fin d'une séquence de soins et entre deux patients.**

Commentaire : Ne pas réutiliser une surblouse ou un tablier à usage unique.
Pratiquer une hygiène des mains après avoir enlevé la protection de la tenue.

INOCULUM

Tri et Conditionnement du linge sale

❖ <u>Cas Particulier du linge considéré comme microbiologiquement à risque :</u>

- Définition :
  - du linge souillé de selles diarrhéiques (salmonelles, shighelles, virus digestifs, Clostridium difficile)
  - Patients atteints de gale, poux, puce

Utilisation d'un sac hydro-soluble

Tri et Conditionnement du linge sale

Pour éviter tout risque lié à la transmission croisée:

- Le conditionnement doit être réalisé à distance du linge propre
- Le chariot support de sacs collecteurs doit être régulièrement nettoyé et désinfecté
- La fermeture des sacs collecteurs ne doit pas générer d'aérobiocontamination
- Les chariots mixtes, (propre et sale) sont à proscrire
- Les sacs de linge sales sont rapidement évacués vers le local de stockage réservé à cet effet
- Ne pas traîner les sacs par terre

Tri et Conditionnement du linge sale

- Le linge sale est :
  - retiré dans son lieu d'utilisation
  - mis dans des sacs collecteurs immédiatement après la collecte en évitant un dépôt intermédiaire (chariot à l'extérieur de la chambre)

- Les sacs sont disposés sur un chariot collecteur à un ou plusieurs sacs

- La couleur des sacs correspond à une famille d'articles triés

Traitement en blanchisserie

- Objectifs
  - Propreté visuelle
  - Propreté microbiologique
    - Bactéricidie : 3 ' à 71 ° C
    - Bactéricidie : 10 ' à 65 ° C
    - Parasites
      - sarcoptes 10 ' à 55 ° C
      - pédiculoses ≥ 60 ° C

Traitement en blanchisserie

- Le traitement est basé sur le cercle de SINNER:

- C 'est l 'association de quatre facteurs
  - la température
  - la durée
  - l 'action chimique des produits
  - l 'action mécanique



le lavage - procédé

- Linge de patient porteur de BMR ou bactéries émergentes: sont résistantes aux antibiotiques mais ne présentent pas de résistance particulière aux produits lessiviels

<u>Cas particuliers</u>:

- Linge provenant d'un patient porteur de poux, puce, gale: traitement préalable du linge par un antiparasitaire pour ne pas contaminer les agents de la blanchisserie

Traitement du linge des patients en PCC

Surveiller prévenir les infections associées aux soins, SF2H , Sept 2010

R49 L'individualisation du matériel réutilisable dans la chambre d'un patient auquel s'appliquent les PCC doit être privilégié. Les stocks laissés dans une chambre doivent être limités. Il n'est pas nécessaire de jeter systématiquement le consommable non utilisé dans la chambre d'un patient auquel s'appliquent les PCC, y compris les patients porteurs de BMR. De même, aucun traitement spécifique n'est requis pour la vaisselle, les ustensiles et le linge utilisés chez un patient auquel s'appliquent les précautions complémentaires de type contact.

Stockage du linge propre

- Garder le linge dans l ' armoire de dotation
- Le linge sorti non utilisé n' est pas remis dans l' armoire :
- Ne pas faire de réserve sauvage

Utilisation du linge propre
Le chariot de nursing

- réservé à cet usage
- nettoyé et désinfecté avant son utilisation pour les soins
- approvisionné de linge et de changes nécessaires aux soins de plusieurs résidents au cours d' une vacation
- ne pénètre pas dans la chambre
- le chariot est vidé, nettoyé et désinfecté après les soins

Utilisation du linge propre

• La manipulation du linge propre est réalisée avec des mains propres sans bijoux, montre, bracelet, vernis, faux ongles

•La propreté visuelle du linge est vérifiée

•Utilisation d'un chariot relais (nursing) pour organiser les soins

- Utilisation de guéridon de soins pour faire les soins de nursing

  - ✓ Le guéridon de soins est approvisionné de linge et de changes nécessaires aux soins immédiats d'un patient
  - ✓ pénètre dans la chambre

- Si pas de guéridon de soins assurer une désinfection d' un plan de travail dans la chambre

Conclusion

Le linge est un vecteur potentiel d'infections associées aux soins

Les points incontournables

- Implication des professionnels dans leur geste quotidien :
  - éviter de contaminer le linge propre
  - Éviter de disséminer les germes contenus dans le linge sale