

Retour résultats ConSores

SPARES

RHH

20/11/2025

Consommation des antibiotiques



SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DE L'ANTIBIORÉSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SPARES)

Points clés 2024 en Guadeloupe

CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES EN 2024 DANS 11 ÉTABLISSEMENTS


CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUES EN NOMBRE DE DOSES DÉFINIES JOURNALIÈRES (DDJ)
POUR 1 000 JOURNÉES D'HOSPITALISATION (JH)



Consommation globale » 238,7



CONSOMMATION PAR TYPE D'ACTIVITÉ




TOP 5 DES ANTIBIOTIQUES CONSOMMÉS




en nombre de DDJ / 1 000 JH

INDICATEURS



*European Centre for Disease Prevention and Control



*Société de pathologie infectieuse de langue française

Points clés 2024 en Guadeloupe

CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES EN 2024 DANS 11 ÉTABLISSEMENTS

CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUES EN NOMBRE DE DOSES DÉFINIES JOURNALIÈRES (DDJ)
POUR 1 000 JOURNÉES D'HOSPITALISATION (JH)



Consommation globale » 238,7



Points clés 2024 en France

CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES EN 2024 DANS 1 392 ÉTABLISSEMENTS

CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUES EN NOMBRE DE DOSES DÉFINIES JOURNALIÈRES (DDJ)
POUR 1 000 JOURNÉES D'HOSPITALISATION (JH)



Consommation globale » 321,9



SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DE L'ANTIBIORÉSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SPARES)

Points clés 2024 en Guadeloupe

CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES EN 2024 DANS 11 ÉTABLISSEMENTS


CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUES EN NOMBRE DE DOSES DÉFINIES JOURNALIÈRES (DDJ)
POUR 1 000 JOURNÉES D'HOSPITALISATION (JH)



Consommation globale » 238,7




CONSOMMATION PAR TYPE D'ACTIVITÉ




TOP 5 DES ANTIBIOTIQUES CONSOMMÉS



INDICATEURS



*European Centre for Disease Prevention and Control



*Société de pathologie infectieuse de langue française

TOP 5 DES ANTIBIOTIQUES CONSOMMÉS



en nombre de DDJ / 1 000 JH

Résultats nationaux

TOP 5 DES ANTIBIOTIQUES CONSOMMÉS



en nombre de DDJ / 1 000 JH

SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DE L'ANTIBIORÉSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SPARES)

Points clés 2024 en Guadeloupe

CONSOMMATION DES ANTIBIOTIQUES EN 2024 DANS 11 ÉTABLISSEMENTS


CONSOMMATION D'ANTIBIOTIQUES EN NOMBRE DE DOSES DÉFINIES JOURNALIÈRES (DDJ)
POUR 1 000 JOURNÉES D'HOSPITALISATION (JH)



Consommation globale » 238,7

Cible
146

CONSOMMATION PAR TYPE D'ACTIVITÉ





TOP 5 DES ANTIBIOTIQUES CONSOMMÉS




en nombre de DDJ / 1 000 JH

INDICATEURS




Résultats Guadeloupe

INDICATEURS



Résultats nationaux

INDICATEURS



Part d'ATB à large spectre en 2019 : 33,5%


→ Objectif non atteint : diminution 10% entre 2019 et 2025

Groupe I Molécules à utilisation préférentielle	Groupe II Molécules à indication restreintes	Groupe III Molécules réservées
Pénicillines - Benzathine-benzylpénicilline, Benzylpénicilline, Phénoxyméthylpénicilline, Procaine-benzylpénicilline - Amoxicilline - Amoxicilline/ac clavulanique - Pivmécillinam - Témocilline - Piperacilline - Cloxacilline - Oxacilline	Pénicillines - Ticarcilline /ac clavulanique - Piperacilline/tazobactam	Céphalosporines - Ceftazidime/avibactam - Ceftolozane/tazobactam - Céfiderocol
Céphalosporines - Céfadroxil, céfalexine - Céfaclor, céfuroxime-axétil - Cefixime, cefpodoxime-proxétil	Céphalosporines - Céfoxitine - Cefixime, Cefpodoxime-proxétil - Céfoxitine, Ceftriaxone, Ceftazidime - Céfépime - Ceftaroline-fosamil, Cefpodoxime-médocaril	Carbapénèmes - Ertapénème, - Imipénème/cilastatine, - Méropénème - Imipénème/cilastatine/rélébactam - Méropénème/vaborbactam
Monabactam - Aztréonam	Fluoroquinolones - Ciprofloxacine, Lévofloxacine, Loméfloxacine, Moxifloxacine, Norfloxacine, Ofloxacine	Fluoroquinolones - Delafloxacine
Macrolides et apparentés - Clarithromycine, Erythromycine, Josamycine, Roxithromycine, Spiramycine - Spiramycine/métronidazole - Azithromycine - Clindamycine - Pristinamycine	Glycopeptides et dérivés - Daptomycine	Glycopeptides et dérivés • Dalbavancine*
Cyclines • Doxycycline, Tétracycline, Minocycline	Oxazolidinones - Linezolid, Tedioleide	Cyclines - Tygécycline
Aminoglycosides - Amikacine,, Gentamicine, Tobramycine	Divers - Acide fusidique - Thiamphénicol - Rifabutine, Rifampicine	Divers - Colistine - Fosfomycine - Streptomycine
Glycopeptides et dérivés - Teicoplanine, vancomycine		
Anti-anaérobies - Métronidazole, Ornidazole, Tinidazole		
Divers - Fosfomycine-trométamol - Nitrofurantoïne - Sulfadiazine - Cotrimoxazole, Triméthoprime - Fidaxomicine		

Résultats Guadeloupe

INDICATEURS

Indicateur SPILF*




*Société de pathologie infectieuse de langue française

Résultats nationaux

INDICATEURS

Indicateur SPILF*



*Société de pathologie infectieuse de langue française

Résistances aux antibiotiques


SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DE L'ANTIBIORÉSISTANCE
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SPARES)

Points clés 2024 en Guadeloupe

Résistance bactérienne aux antibiotiques en 2024
dans 7 établissements

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

0%
Proportion de SARM chez
Staphylococcus aureus
isolé d'hémocultures



0,01
Densité d'incidence
SARM / 1 000 JH




Enterobacterales

Klebsiella pneumoniae BLSE

0,16
Densité d'incidence de
K. pneumoniae produisant
une BLSE / 1 000 JH



Densité d'incidence
Enterobacterales
produisant une
BLSE / 1 000 JH



Densité d'incidence
Enterobacterales produisant
une carbapénémase / 1 000 JH

Proportion de
souches produisant
une carbapénémase
chez *K. pneumoniae*
isolée d'hémocultures

Principales
EBLSE



Escherichia coli BLSE


Klebsiella pneumoniae BLSE

Enterobacter cloacae complex BLSE



Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

0%
Proportion de SARM chez
Staphylococcus aureus
isolé d'hémocultures



0,01
Densité d'incidence
SARM / 1 000 JH



Résultats nationaux

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

10,4%
Proportion de SARM chez
Staphylococcus aureus
isolé d'hémocultures



0,13
Densité d'incidence
SARM / 1 000 JH



Enterococcus faecium résistant à
la vancomycine (ERV)

0,6%
Proportion d'ERV chez
Enterococcus faecium
d'hémocultures



SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DE L'ANTIBIORÉSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SPARES)

Points clés 2024 en Guadeloupe

Résistance bactérienne aux antibiotiques en 2024 dans 7 établissements

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

0%
Proportion de SARM chez *Staphylococcus aureus* isolé d'hémocultures



0,01
Densité d'incidence SARM / 1 000 JH




Enterobacterales

Klebsiella pneumoniae BLSE

0,16
Densité d'incidence de *K. pneumoniae* produisant une BLSE / 1 000 JH



Densité d'incidence Enterobacterales produisant une BLSE / 1 000 JH



Principales EBLSE

8%
72%
8%

Escherichia coli BLSE

Klebsiella pneumoniae BLSE

Enterobacter cloacae complex BLSE




Enterobacterales

Klebsiella pneumoniae BLSE

0,16
Densité d'incidence de *K. pneumoniae* produisant une BLSE / 1 000 JH



Densité d'incidence Enterobacterales produisant une BLSE / 1 000 JH



Principales EBLSE

8%
72%
8%

Escherichia coli BLSE

Klebsiella pneumoniae BLSE

Enterobacter cloacae complex BLSE



6 hémocultures seulement
→ 1/6 positive
→ Non exhaustif
→ Manque des données
→ Biais de résultat +++


Résultats nationaux

Klebsiella pneumoniae BLSE

0,18
Densité d'incidence de *K. pneumoniae* produisant une BLSE / 1 000 JH



Densité d'incidence Enterobacterales produisant une BLSE / 1 000 JH



Principales EBLSE

44%
31%
17%

Escherichia coli BLSE

Klebsiella pneumoniae BLSE

Enterobacter cloacae complex BLSE

